

卷

十

四

吉慶堂



關中

西陵

○漢書

劉向曰凡有災異及疾病者皆曰災後漢書
若水滿月休而雲集則災於月勝散於月勝故腹痛作也
如雖刀所刺而火入火勝水不化則為腸鳴或下赤白腸鳴
或痛或不定急腹謂中腸是也古醫有以急腹為中腸者
詳之詳之

陳微進曰此症下痢非止一經當通利之

國人所不察其然則有損於人而益於病

BGA 2036

0.8

濟陰綱目卷之十四

關中

武之望叔卿父著輯

武林

薛

芳汝楫父訂正

西陵

汪

淇瞻漪子箋評

天都

查

望千周父叅閱

○泄瀉

郭稽中曰。產後腹痛及泄利者。何答曰。產後腸胃虛怯。寒邪易侵。若未滿月。飲冷當風。乘虛襲留於育膜。散於腹脇。故腹痛作陣。或如錐刀所刺。流入大腸。水穀不化。洞瀉腸鳴。或下赤白。脘脇臍脹。或痛走不定。急服調中湯立愈。若醫者以爲積滯取之。禍不旋踵。謹之謹之。

陳無擇評曰。產後下痢。非止一證。當隨所因而調之。旣云飲冷當風。何所不至。寒熱風濕。本屬外。因喜怒憂思。還從內性。况勞役饑

飽皆能致病。若其洞泄，可服調中湯。赤白帶下，非此能愈。各隨門類，別有三方。

此十一注，須體酌純熱然，只用八方，加減可未要而約矣。而八方之中，以六君子加味者五，補中益氣者一，而益黃四神八味腎氣等藥，或兼或肝，真切減當於此得心，其他亦可變通矣。又何患方之不廣，用之不神歟。

薛氏曰：產後瀉痢，或因飲食傷損脾土，或脾土虛不能消食，當審而治之。若米食所傷，用六君子加穀蘗。若麪食所傷，用六君子加麥蘗。若肉食所傷，用六君子加山楂神麴丸。兼嘔吐，皆加藿香。若兼噤酸或嘔吐，用前藥送越鞠丸。若肝木來侮脾土，用六君子加柴胡、芍藥。若寒水反來侮土，用錢氏益黃散。若久瀉，或元氣下陷，兼補中益氣湯，以升發陽氣。若瀉痢色黃，乃脾土真氣，宜加木香、肉果。若脾土虛寒，當用六君子加木香、薑桂。若脾腎虛寒，用補中益氣及四神丸。若屬命門火衰，而脾土虛寒，用八味丸以補土母。若小便清滯，肢體漸腫，或兼喘咳，用金匱腎氣丸以補脾腎利水道。若腎

按總方所
言脾氣虛
寒用

氣虛弱而四肢浮腫。治須補胃為主。若久而不愈。或非飲食所傷而致。乃屬腎氣虧損。蓋胞胎主於杠而繫於腎。况九月十月乃腎與膀胱所養。必用四神六味八味三藥以補腎。若用分利導水之劑。是虛其虛也。

一產婦瀉痢發熱作渴。吐痰甚多。肌體消瘦。飲食少思。或胸膈痞滿。或小腹脹墜。年餘矣。余以爲脾胃瀉。朝用二神丸。夕用六君子。三月餘而痊。

一婦產後泄瀉。兼嘔吐。噯酸。面目浮腫。此脾氣虛寒。先用六君子。炮薑爲主。佐以越鞠丸。而噯酸愈。又用補中益氣。加茯苓半夏而脾胃康。

一產婦泄瀉年餘。形體骨立。內熱晡熱。自汗盜汗。口舌糜爛。口吐

六君加木香
薑桂而此止
加炮薑一味
為主是又不
必拘於一定
之法矣

此法據前條
止用補中四

神而此又加
一十全大補
可見須因症
用藥毋執泥
也

此症若只擬
前法而用六

君補中不用
升陽益氣便

痰三碗許。脈洪大重。按全無。此命門火衰。脾土虛寒。而假熱也。吐
痰者。乃脾虛不能統攝歸源也。用八味丸補火以生土。用補中益
氣湯兼補肺金而脾胃健。

一產婦腹痛後重。去痢無度。形體倦怠。飲食不進。與死為鄰。此脾
腎俱虛。用四神丸十全大補湯而愈。但飲食難化。肢體倦怠。用補
中益氣而康。

一婦人五月患痢。日夜無度。小腹墜痛。發熱惡寒。用六君子湯送
香連丸二服。漸愈。仍以前湯送四神丸四服。全愈。至七月終。怠惰
嗜臥。四肢不收。體重節痛。口舌乾燥。飲食無味。大便不實。小便頻
數。酒慄惡寒。悽慄不樂。此肺與脾胃俱虛。而陽氣虛寒。不伸也。用
升陽益氣湯而痊。

非范法故知
立言之中有
不言之妙所
謂言不盡意
也
丹溪云泄瀉
症最惡一切
湯飲石山亦
然所謂理無
二致也

汪石山治一婦產後滑泄勺水粒米弗容時即泄下如此半月餘
眾皆危之或用五苓散平胃散病益甚汪診之脈皆濡緩而弱曰
此產中勞力以傷其胃也若用湯藥愈滋胃濕非所宜也今以參
苓白朮散除砂仁加陳皮肉豆蔻煎薑棗調服旬餘而安

調中湯治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛泄瀉不止

良薑

當歸酒浸

肉桂

不見白芍炒

川芎

附子

炮去皮尖各一兩

人參

甘草

炙各半兩

右呖咀每服三錢水煎服

荳蔻理中丸治產後元氣虛弱臍腹疼痛泄瀉不止又治男子

脾胃虛弱久泄不止

人參

一兩

白朮

二兩

乾薑

炮

甘草

炙各五錢

肉豆蔻

麝香煨

此收澁之劑
陳皮與粟殼
相等得處方
之妙

右爲細末。煉蜜丸。如桐子大。每服四五十丸。空心米飲下。酒者
麪糊丸亦可。

神効參香散。治產後脾胃虛寒。泄瀉洞下。及痢疾日久。穢積已
盡。滑瀉不止。此收澁如神。

人參

木香

錢各二

肉豆蔻

煨

白茯苓

白扁豆

錢各四

陳皮

罌粟殼

去帶襁醋
炙各一兩

右爲細末。每服一錢七。清米飲調下。食遠服。

萬歷己亥。余官金陵。內人十二月產。難經宿。始娩。越旬日。洞瀉
點水。入口即下。內人悲懼大哭。自謂必死。余偶有此藥。用一錢
以米飲調服。纔下咽。瀉即
止。真起死迴生之藥也。

○痢疾

大全云。產後痢疾者。由產勞傷。臟腑不足。日月未滿。虛乏未復。或

大全云。產後痢疾。由走泄血。藏府不足。因月來。血虛。未復。或

痢赤為熱。青之為寒。此古人之論。自河間論出。不分五色物。以為熱。豈古今不同歟。大槩始於傷冷。久變為熱。故執者多而寒者少。未可執以無寒也。必因症求之。為當。

勞動太早。或誤食生冷。若行起太早。則外傷風冷。寒虛入於腸胃。若誤食生冷。則難化之物。傷於脾胃。皆令洞泄水瀉。變為痢也。若血滲入大腸。則為血痢。難治。世謂之產子痢也。得冷則白。或如魚腦。得熱則赤黃。或為驟血。若冷熱相搏。則下痢赤白。或膿血相雜。若下痢青色。則極冷也。若飲食不進。便利無常。日夜無度。產後本虛。更加久痢不止。無力瘦之。愈見羸弱。謂之虛羸下痢。又有產後氣血不順。而下痢赤白。謂之氣痢。治之之法。熱則涼之。冷則溫之。冷熱相搏。則調之。滑者澀之。虛羸者補之。水穀不分者。當利小便。若產婦情性執着。不能寬解。須當順其氣。未有不妥者也。薛氏曰。前證白屬氣分。而赤屬血分也。其論詳見瀉利。

一產婦食雞子。腹中作痛。面色青黃。服平胃二陳。更下痢。腹脹服

若果脉大無

力可不溫補

而乃用黃芩

乃藥湯皆以

纏墜極痛之

症為精滯未

去也故從症

不從脉理

凡理氣虛不

能致津液以

養臟腑而渴

者宜一味白

朮煎湯代茶

庶無水腫之

患

理尋愈

流氣飲子又小腹一塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木剋侮所致用補中益氣加木香吳茱萸漸愈又用八珍大補兼服調

一婦產後痢未至月滿因食冷物及酒冷熱血面改壅滯下純血

纏墜極痛其脉大無力口乾用黃芩芍藥湯三服而安

產後下痢作渴者水穀之精化為血氣津液以養臟腑臟腑虛燥

故痢而渴若引飲則難止反溢水氣脾胃既虛不能剋水水自流

溢浸漬皮膚則令人腫但止其渴痢則自瘥

薛氏曰痢證若渴而不喜飲食屬胃氣虛不能生津液宜用七味

白朮者夜間發熱口渴屬腎水弱而不能潤宜用六味丸並佐以

益氣湯以滋化源

此以四物得
去川芎加艾
膠所以止血
也而歸甘各
用三兩為君
所以和氣血
而止腹痛耳
妙在甘以緩
之
二方一為氣
虛一為血虛
而前方妙在
分兩此方重
在虛滑不熱
參米建穀草
常談之味
白頭翁湯原
仲景治陽熱
毒痢藥而脈
經加膠甘以

救急散。治產後赤白痢。腹中絞痛。

白芍 阿膠 艾葉 熟地黃各一 當歸

甘草各三兩

右吹咀。水煎分二服。空心飲。

加味四君子湯。治產後赤白痢神效。

人參 白朮 白茯苓 甘草炙 黃耆各一錢

罌粟殼炙去蒂五分

右剉水煎。

以上三方治虛滑

白頭翁加甘草阿膠湯。治產後下痢虛極。脈經作熱痢重。下新產虛極者。

白頭翁 甘草炙 阿膠炒各二兩 黃連 黃蘗

治熱產極虛
然非熱刺下
血其敢用乎

前以四物栗
壳治氣虛而
滑此以四物
栗壳以治血
執虛滑氣血
之分智者自
辨而止虛之
劑其治勿投
慎之
此方以三黃
藥為主非
重熱勿用辨
之

秦皮去皮各三錢

右剉作二服水煎納膠令消盡溫服

槐連四物湯治產後熱滑血痢臍腹疼痛

當歸

川芎

赤芍藥炒

生地黄

槐花炒

黃連炒各一錢 郢米穀去蒂蜜炙五分

右剉水煎服

黃連丸治產後熱滑赤白痢腹中攪痛不可忍

黃連四兩

黃芩

黃蘗各一兩

梔子仁

阿膠

蒲黃各一兩 當歸二兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸米飲下日三夜一

以上三方治熱滑

以下此症字真切不落一空用此方者須知集方之心所謂無妄之藥勿試也
以血瀉而用姜桂人所難信而謂寒滑不禁又所當遭夫學道愛人用方者宜休認之
此方以神仙感應為名心非虛語然以厚食量早而致海苔脾胃必薄故用麥

神効參香散 治痢疾日久穢積已少腹中不痛或微痛不結滑溜不止乃收功之後棄也

方見前泄瀉

一方 治產後血瀉不禁餘血作痛兼塊屬寒滑者

桂心 乾薑各等分

右為末空心酒調服方寸匕

以上三方治寒滑

神仙感應丸 產後固無積痢多有因食葷味早亦作瀉痢者百無一生非此方不能救之三二服立止不然荏苒日月致不救也如不因食葷者不可服

神効炒一人參 熟地
只受麵炒去穢
枳殼各一錢

木而神變為

化食之用枳

壳佐之赤石

脂固之似矣

而熟地何為

也大抵腎者

胃之關從後

腎虛氣不能

固故用之歟

於食軍不食

薑可服不可

服之理自非

庸人所知

凡治積方不

等而此所集

方一用地黃

石脂此用連

翹好墨赤大

異也其他不

過溫氣行氣

白朮各二錢

右為細末每服三錢空心米飲調下

連翹丸治產後久病赤白痢蓋因脾胃不和氣滯積聚所致心

腹脹滿乾嘔酸心飲食不下胸膈噎塞脇肋疼痛危困者

連翹 陳皮白 京三稜各錢半 肉桂不見火 檳榔

牽牛子取頭末 蓬朮 青皮去白各一錢 肉豈蔻煨好墨各半兩

右為細末麪糊丸如桐子大每服三十丸米飲下或用水煎服

亦可

以上三方治積痢

三聖散治產後下血痢不止

烏魚骨 燒綿灰 血餘灰汗脂者各等分

有人用何藥
於何方可再
求之

名爲細末每服一錢煎石榴皮湯調下熱服

一方治產後痢日五十行者

取水裏蠶糞炒黃急以水沃之令稀調得所服之即愈

治產後諸痢雜方

取蒼耳葉搗汁半盞日三四溫服

一方煮薤白食之

一方羊腎脂炒薤白空心食之

一方敗龜板一枚米醋炙研爲末醋湯調下

治產後血痢雜方

一方用阿膠二兩以酒一升半煮一升頓服

一方用生馬齒莧搗汁二大合煮一沸下蜜二合調頓服

清心生津

瀉氣生津

為消渴所宜
故服之

以上雜治方

必効方 瘰癧後痢而渴飲無度數

麥門冬三兩

烏梅二十箇

右細剉水一升煮取七合細呷

經効方 瘰癧後久痢津液稠渴不止

龍骨十二分

厚朴

茯苓

黃耆

麥門冬

人參各八分

生薑六分

大棗十四枚

右細剉以水一大斗煮取七合空心分兩服

錄驗方

瘰癧後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥

冬瓜一枚黃泥糊厚五寸煨爛熟去皮絞汁服之痊

七味白朮散

治產後痢津液竭渴不止

以上治痢疾發渴

大和胃胃以生津

方見前渴

以上治痢疾發渴

○大便秘澁

郭稽中曰。產後大便秘澁者。何。答曰。產後水血俱下。腸胃虛弱。津液不足。是以大便秘澁不通也。若過五六日。腹中悶脹者。此乃燥屎在臍。臍以其乾澁。未能出耳。宜服麻仁丸。以津潤之。若誤以爲有熱。投之寒藥。則陽消陰長。變證百出。性命危矣。

薛氏曰。前證因去血過多。大腸乾涸。不可計其日期。飲食數多。而用藥通之。必待腹滿覺脹。欲去不能者。乃結在直腸。且用猪膽汁潤之。若服苦寒疎通之劑。反傷中氣。或愈加難通。或通而不止。或成痞證也。若去血過多者。用十全大補湯。若血虛火燥者。用加味

四物湯氣血俱虛者用八珍湯雖數日不通飲食如常腹中如故仍用八珍加桃仁杏仁治之若泥其日期飲食數多而通之則誤矣。

一產婦大便秘不通七日矣飲食如常腹中如故余曰飲食所入雖倍常數腹不滿脹用八珍加桃仁杏仁至二十一日腹滿欲去用豬膽汁潤之先去乾糞五七塊後皆常糞而安。

一產婦大便秘八日不通或用通利之藥中脫脹痛飲食甚少或云通則不痛病則不通乃用導之大便不禁吃逆不食余曰此脾腎復傷用六君加吳茱萸肉果骨脂五味數劑喜其年壯而愈不然多致不起。

一產婦大便秘結小腹痛脹用大黃等藥致吐瀉不食腹癰胸痞。

婦人大便秘結諸藥不應苦不可令飲人乳而安。

一產婦大便秘結。小復長痛。用大黃等藥。致上。不可不慎。及前同法。

余用六君子加木香炮薑治之而愈。

一婦人大便秘澁。諸藥不應。苦不可言。令飲人乳而安。

李氏曰。產後大便秘者。芎歸湯加防風枳殼甘草。秘澁者。麻子仁

丸。或蘇麻粥。蓋產後去血多。則鬱胃。鬱胃則汗多。汗多則大便秘。

皆血虛也。

調導散。治婦人產前產後大便秘。

當歸 川芎 防風 枳殼各四錢 甘草炙二錢

右咬咀。每服一兩。用生薑三片。棗一枚。水煎溫服。忌動風物。

麻仁丸。治產後去血過多。津液枯竭。不能轉送。大便秘澁。

大麻仁研如泥 枳殼麩炒 人參各一兩 大黃半兩

右為末。煉蜜丸。如桐子大。每服二十九。空心溫酒米飲任下。未

用防風蘇
飲降之。先
升之也。

亦是其

通漸加丸數不可太過

評曰產後不得利利者百無一生去血過多臟燥大便秘澀則

固當滑之大黃似難輕用唯葱涎調臘茶為丸復以臘茶下之

必通

產後固不可輕用大黃然大腸秘結不通或惡露點滴不出不得大黃以宣利之勢必不通但利後即當以參耆白朮甘草及芎歸等藥大劑調補之不然元氣下脫後將不可救矣

滋腸五仁丸 治產後血氣虛損大腸閉澀傳道艱難

杏仁去皮麪炒 桃仁如上製 柏子仁錢五 松子仁一錢

郁李仁麪炒 橘紅四兩為末

一方加當歸稍五錢

右五仁另研為膏合橘皮末和勻再研煉蜜丸如桐子大每服

以橘紅為君者為潤下也

一、方加當歸、桂枝、五錢
台、五、二、易、研、為、散、合、酒、及、水、和、勻、再、煎、取、清、飲、之、

三十九。加至五六十丸。終前清米飲下。

阿膠枳殼丸。治產後大便秘澀。

二、味有見。

阿膠

枳殼各等分

右為末。煉蜜丸。如桐子大。清石末為衣。溫水下二十丸。未通再服。

麻蘇粥。婦人產後有三種疾。鬱胃則多汗。汗多則大便秘。故難

以用藥。惟麻子、蘇子粥最為穩當。

蘇子

大麻子各半合洗淨

右研極細。用水再研。取汁一盞。分二次煮粥。服下。

本事方云。此粥不惟產後可服。大抵老人諸虛風秘。皆宜服之。嘗有一人。年八十四。忽爾腹痛。頭疼。惡心。不食。召醫數十。議

皆用補脾進食治風清利頭目等藥數日雖愈全不飲食其家
憂惶余辯說前藥皆誤矣此證正是老人風秘臟腑壅滯聚於
胸中則腹脹惡心不思飲食又上至於顛則頭痛神不清也若
臟腑流暢諸疾悉去矣予命作此粥兩啜而氣泄先下結糞如
胡桃者十餘枚後漸得通利不用藥而自愈矣

兵部手集方 治產後秘結不通膨滿氣急坐臥俱難

用大麥蘖炒黃爲末酒下一合神效

用大麥自有心得

○大小便不通

大全云產後大小便不通者本腸胃挾熱因產後血水俱下津液
燥結腸胃痞滿熱氣內結於腸胃故令大小便不通也

薛氏曰治一婦大小便不通諸藥不應將危矣令飲牛乳一口稍

通氣散 治產後大小便不通

通氣

通三日而痊人乳尤善

通氣散。治產後大小便不通。

陳皮

蘇葉

枳殼炒麩

水通各等分

右剉散。每服四錢。水煎溫服立通。

桃仁散。治膀胱氣滯。大小便閉。

桃仁

葵子

滑石

檳榔各等分

右為細末。每服二錢。空心葱白湯調下。

枳殼丸。治產後天小便澀滯。

木香一錢

枳殼炒

麻仁炒黃

大黃各一兩

右為末。煉蜜丸如桐子大。每服三十丸。溫水送下。食後如飲食

不化亦宜服之。

通氣涼血

通血

涼大小腸血而反止血者也則牡蠣之游與別藥不同

一方治產後大小便不利下血

車前子

黃芩

蒲黃

牡蠣

生地黃

芍藥

各一兩五錢

右為細末空心米飲調服方寸匕忌麴棗

金鑰匙散

治產後大小便不通腹脹等證

滑石

蒲黃各等分

右為細末酒調下二錢

○遺尿

薛氏曰產後遺尿者脾腎虛弱用還少丹仍以補中益氣湯為主

虛寒加肉苁蓉補骨脂或四神丸若脾腎虛寒用八味丸兼四神

丸仍佐以前三方按產後遺尿乃腎氣不固宜五味子散主之

夫腎開竅於二陰而大便者血之道腎主之故立齋集方皆以脾腎為治以命門兼之者上

溫也
非大有見者
不能主此方

以下二方乃
白良所集各
取其義也

一產婦大便不實飲食少思五更或清晨遺尿此中氣虛寒脾腎
不足用補中益氣送四神丸而痊

產婦小便出數名大小腸交乃氣不但虛失行常道用六君
子二劑又用五苓散一劑而痊諸常腸交亦可用

補遺方 療產後遺尿不知亦治遺尿

白飲

芍藥

各七
分

右為末酒調服方寸匕

集驗方 療產後遺尿亦治男子

桔礬

牡礬

煅各
等分

右為末酒調服方寸匕日三服

加味補中益氣湯 治脾腎虛寒大便不禁

此加法火土相生之理然非原方所加以此推之能以此無法觀法斯為妙法

本草以肉蓯蓉善動大便人皆忌之今治遺精而立齋反以為用立齋為一代名醫而反不知即以前所常用則不忌耳

黃耆

人參

白朮

甘草

各錢

當歸

陳皮

各七

升麻

柴胡

各三

肉蓯蓉

補骨脂

各五

右到一劑水煎服

還少丹

治脾腎虛弱遺精

肉蓯蓉

遠志

肉桂

巴戟

乾山藥

枸杞子

熟地黃

石菖蒲

山茱萸

牛膝

杜仲

去皮

楮實子

五味子

白茯苓

各三

右為末

用棗肉百枚同煉蜜丸

如桐子

每服五七十九

空心溫

酒或鹽湯下日三服

四神丸

治脾腎虛弱大便不實

或五更作瀉

破故紙

吳茱萸

炒各

肉豆蔻

五張子

各一

姜取藥肉和藥丸同子心并服至十九空心中熱易下

右為末。用大紅棗四十九枚。生姜四兩。切碎。同藥用水煮熟。去
姜。取棗肉和藥丸。桐子大。每服五十丸。空心鹽湯下。

五味子散。治腎泄。

五味子

兩

吳茱萸

兩

右炒香熟。研為細末。每服二錢。陳米飲調下。

廣濟方。

治產後遺糞。亦治男子。

取故燕窩中草。燒為末。以酒調下半盞。

○淋瀝。

熱邪搏血。則
有之。滲入胞
中。則未也。如
交。則症亦甚。
滲入而來耶。

大全云。產後諸淋。因熱氣客於脬中。內虛則類數熱。則小便澀痛。
故謂之淋。○又有因氣虛挾熱。熱邪搏血。滲入胞中。血隨小便而
出。為血淋者。

五淋各治有
虛實然則冷
熱無分矣

三因論曰。治諸產前後淋瀝。其法不同。產前當安胎。產後當去血。如其冷熱膏石氣淋等。爲治則一。但量其虛實而用之。瞿麥蒲黃最。是產後要藥。唯當究其所因。則不失其機要矣。

薛氏曰。按前證。若膀胱虛熱。用六味丸。若陰虛而陽無以化。用滋腎丸。蓋土生金。金生水。當滋化源也。仍察淋瀝頻數。門調治。

一產婦小水淋瀝或時自出用分利降火之劑二年不愈余以爲

肺腎之氣虛用補中益氣湯六味地黃丸而痊。

茅根湯。治產後諸淋。無問冷熱。皆有氣結。悉主之。

此方甚良

白茅根

五錢

瞿麥穗

白茯苓

各二錢半

葵子

人矣

各一錢二分半

蒲黃

桃膠

滑石

甘草

各六分

紫貝

一箇

石首魚腦砂

二
燬
簡

策具石首書

石林要藥

有劉分三貼。加生薑三片。燈心二十根。水煎服。或為末。每服二

錢。木通煎湯調下。如氣壅閉。木通橘皮煎湯調下。

滑石散。治產後熱淋。

滑石

一兩二錢半研

通草

車前子

葵子

各兩

右為末。以漿水調服。方寸匕。至三七為妙。

滑石通淋散。

產後小便緊澁不通者。因血熱積於小腸。經水不

利。恣食熱毒之物。而成淋澁故也。

赤茯苓

澤瀉

木通

黃連

豬苓

各八分

白朮

瞿麥

山梔子

車前子

各等分

滑石

四分

右劉加燈心十二莖。水煎。空心熱服。

石韋散。

治婦人小便卒淋澁。

石韋 黃芩 木通 榆白皮 葵子

瞿麥穗 甘草各等分

右吹咀每服八錢加生姜三片水煎食前溫服

加味四物湯 諸淋皆屬於熱用此累効

當歸 川芎 赤芍藥 生地黃 甘草稍

杜牛膝 木通各一錢 桃仁去皮尖五箇 滑石一錢半 木香

右剉水煎服

一方療產後淋小便痛及血淋

百茅根五分 瞿麥 車前子各一兩 鯉魚齒一百根為去

通草三分 冬葵子三分

右以水三升煮取一升入魚齒末空心服

小腸氣道也
肝主之陳皮
杏仁皆利氣
藥故有驗

積冷者用此
所謂氣化則
能通矣

張氏方 療產後小便不通淋瀝

陳皮一兩去白爲末。空心溫酒調下二錢。一服便通。

療卒不得小便方。

杏仁十四枚。去皮尖炒爲末。和飲頓服。

炙臍法。治產後小便不通。腹脹如鼓。悶亂不醒。蓋緣未產之前。內積冷氣。遂致產時。尿胞運動不順。

用鹽填臍中。却以葱白。剝去麤皮十餘根。作一縛。切一指厚。安鹽上用大艾炷滿葱餅上。以火炙之。覺熱氣入腹內。卽時便通神驗。

○小便數。

大全云。夫產後小便數者。乃氣虛不能制故也。

薛氏曰。前證若因隱憂不慎。以致胞損。而小便淋瀝者。用八珍湯。以補氣血。若因膀胱氣虛。而小便頻數。當補脾肺。若膀胱陰虛。而小便淋瀝者。須補脾腎。

一產婦。小便頻數。時忽寒戰。乃屬脾肺虛弱。用補中益氣。加山藥為主。佐以桑螵蛸散。而愈。後患發熱。肺熱盜汗。自汗。月水不調。用加味道遙散而安。

一產婦。患前證。吐痰發熱。日晡作渴。此膀胱陰虛。用補中益氣湯。及六味丸。而愈。又患痢後。小便頻數。手足但冷。屬陽氣虛寒。用前湯及八味丸而瘳。

桑螵蛸散。治產後陽氣虛弱。小便頻數。及遺尿。

桑螵蛸

三十

鹿茸

酥炙

黃耆

各三

牡蠣

煅

人參

右為末。每服二錢。空心調下。

此治虛熱

此命門藥也
專主縮小便
虛寒者宜之

厚朴 赤石脂各二兩

右為末。每服二錢。空心粥飲調下。

外臺方。無厚朴。石脂有甘草。生姜。

栝蒌湯。療產後小便數兼渴。

栝蒌根 人參各三兩 黃連 桑螵蛸 甘草炙 生姜各一兩

大棗五十枚

右細切。用水七升。煮二升半。分三服。忌猪肉冷水。

補遺方。療產後小便數及遺尿。

益智仁為末。米飲調服。

○小便不禁

陳氏曰。婦人產後產理不順。致傷膀胱遺尿無時。

妙在有破血之藥

丹溪云。嘗見收生者不謹。損破產婦尿管。致病淋瀝。遂成廢疾。一
日有徐婦。年壯難產。得此因思。肌肉破傷。在外者宜用補血。胞雖
在腹。恐亦可治。遂診其脈虛甚。予曰。難產之由。多是氣虛。產後血
氣尤虛。試與峻補。因以參耆為君。芎歸為臣。桃仁陳皮黃耆茯苓
為佐。煎以猪羊胞中湯。極饑時飲之。但劑小。率用一兩。至一月而
安。蓋令氣血驟長。其胞自完。恐稍緩亦難成功矣。
薛氏曰。前證若脾肺陽虛。用補中益氣湯。加益智。若肝腎陰虛。用
六味地黃丸。若肝腎之氣虛寒。用八味地黃丸。
一產婦。小便不禁。二年不愈。面色或青赤。或黃白。此肝脾氣虛。血
熱。用加味逍遙散為主。漸愈。佐以六味地黃丸。而痊。後因怒。小便
白遺。大便不實。左目頓緊。面色頓赤。仍用前散。佐以六君子湯。以

以下七方悉有至理放之本草乃見方不虛立集次有條醒心會意者當自得之

清肝火。生肝血。培脾土。而痊。

千金方。治產後小便不禁。

白薇

芍藥各等分

右為末。溫酒調下。方寸七日三服。

又方。治產後小便不禁。

桑螵蛸半兩炙

龍骨一兩

右為末。每服二錢。粥飯調下。

雞內金散。治產後溺淋失禁。

用雄雞胗一具。並腸洗。燒為末。溫酒調服。方寸七。

廣濟方。療產後小便不禁。

用雞尾毛。燒灰存性。酒調下一錢。七日三服。

黃耆當歸湯。婦人產後尿不禁。面微淨。略發熱。於午後。此膀胱

為坐婆所傷。

歸尾破血

黃耆

歸身尾

枳殼

錢半

白朮

錢一

人參

陳皮

各五分

甘草

許炙少

右水煎熱服之

固脬散

治婦人臨產時傷手脬破小便不禁

黃絲絹

自然黃者染黃者不用取三尺以炭灰汁煮極爛以絹水洗去灰令淨

黃蠟半兩

蜜一兩

白茅根

馬尾勃

為末各二錢

右用水二升再煎至二盞空心頓服服時飲氣服之不得作聲

如作聲無効

補脬飲

治產後傷動脬破終日不小便但淋瀝不乾

生熟絹

黃色者一尺

白牡丹根皮

白芨

各一錢

右用水一碗煎至絹爛如飴服之勿作聲作聲無効

丹皮破血白芨滿飲

黃絹者爛固脬黃蠟護膜生肌茅根破血止血馬勃塞虛漏之際

大全云產後小便出血者因氣血虛而熱乘之血得熱則流散滲

丹皮被血自

右用水一斗。煎至相。關如湯服之。勿作聲。作聲。無功。

小便出血

大全云。產後小便出血者。因氣血虛。而熱乘之。血得熱則流散。滲於胞內。故血隨小便出。

以歸脾而愈。豈尿血亦為脾不攝血歟。臨症須酌之。

薛氏曰。一產婦尿血面黃。脇脹少食。此肝木乘脾土也。用加味道遙補中益氣。兼服而愈。後為懷抱不樂。食少體倦。驚悸無寐。血仍作。用加味歸脾湯二十餘劑。將愈。惑於眾論。服犀角地黃湯。諸證復作。仍服前湯而愈。

血餘散。治產後小便出血。

飢髮不拘多少。湯洗淨。燒灰研為末。米飲調服方寸匕。

滑石散。治產後小便出血。

即此五方條。理有序品味。合宜孰能遺之。

滑石 研

髮灰 等分

右爲末。每服一錢。生地黄汁調下。

崔氏方。療產後血滲入大小腸。

蜜一大合車前草一升

右相和煎沸分兩服。

補遺方。治產後小便出血。

川牛膝去蘆水煎服。

又方。

生地黄汁半升生薑自然汁半升

右相和服之。

○大便出血。

薛氏曰。產後便血。或飲食起居。或六淫七情。以致元氣虧損。陽經

醒湯。若因怒動肝火。加柴小葉胡湯。若因鬱結傷脾。加味歸脾湯。

薛氏曰。產後便血。或飲食起。或上。至。七。以致元氣虧損。此
外傷。治法若因膏粱積熱。用加味清胃散。若因醇酒濕熱。葛花解
醒湯。若因怒動肝火。加味小柴胡湯。若因鬱結傷脾。加味歸脾湯。
若因思慮傷心。妙香散。若因大腸風熱。四物加側柏槐花。若因大
腸血熱。四物加芩連槐花。若因腸胃虛弱。六君加升麻柴胡。若因
腸胃虛寒。六君加肉蔻木香。若因元氣下陷。補中益氣加茯苓半
夏。若因胃氣虛弱。用六君升麻。若因血虛。用四物升麻。若因氣血
俱虛。用八珍柴胡升麻。大凡元氣虛弱而發熱者。皆內真寒而外
假熱也。但用六君子。或補中益氣。加炮姜溫補脾氣。諸證悉退。若
四肢畏冷。屬陽氣虛寒。急加附子。病因多端。當臨症制宜。庶無悞
矣。

一產婦。產後下血。諸藥不愈。飲食少思。肢體倦怠。此中氣虛弱。用

源陽系下 卷一
補半益氣。加吳茱萸炒黃連五分。四劑頓止。用歸脾湯治之而痊。
一婦人怒則便血。寒熱口苦。或胸脇脹痛。或小腹痛悶。此肝木乘
脾土。用六君子加山梔柴胡而愈。又用補中益氣加味逍遙二劑。
而不復作。

一婦人久下血。在舊前。屬脾胃虛寒。用補中益氣湯加連炒吳茱
一錢。數劑稍効。乃加生吳茱萸五分。數劑而愈。

一產婦大便後血。口乾飲湯胸脇膨滿。小腹悶墜。內執瞞熱。食少
體倦。日晡面赤。洒淅惡寒。此脾肺氣虛。先用六君加炮薑木香。漸
愈。用補中益氣將愈。用歸脾湯而愈。後因勞役兼怒。氣發熱血崩。
夜間譫語。此熱入血室。用加味小柴胡二劑而熱退。用補中益氣
而血止。用逍遙散歸脾湯調理而康。

加味清胃散 治因膏梁積熱便血

當歸身

酒浸一錢

黃連

生地黄

酒洗

升麻

各二錢

牡丹皮

半錢

石膏

右剉水煎服

○一方無石膏有犀角連翹甘草

的奇散 治產後惡露不行餘血滲入大腸洞瀉不禁下青黑物

亦驗

用荆芥大者四五穗於盞內燃火燒成灰不得犯油火入麝香少許研勻沸湯一兩呷調下此藥雖微能愈大病幸勿忽之

產後陰下有物脫出產腸不收

三因方云婦人趣產勞力努極致陰下脫若脫肝狀及陰下挺出

物原系非 卷一 口 三
逼迫腫痛。或舉動房勞。皆能發作清水。續續小傾淋瀝。

丹溪云。一婦人三十餘歲。生女二日後。產戶下一物如手帕。下有帕尖。約重一觔。予思之。此因胎前勞乏。傷氣或肝痰所致。却毒血不甚虛耳。其時暮天寒。恐冷乾壞了。急與炙黃耆半錢。人參一錢。白朮五分。當歸一錢半。升麻五分。三帖連服之。即收上。得汗通身乃安。但下齋沾席處。乾者落一片。約五六兩重。蓋脂膜也。食進得眠。診其脉皆瀉。左畧弦。視其形却實。與白朮芍藥各半錢。陳皮一錢。生姜一片。煎二三帖。以養之。

一婦人產子後。陰戶中下一物。如合鉢狀。有二岐。其夫來求治。予思之。此子宮也。必氣血弱而下墜。遂用升麻當歸黃耆大料一帖。與之。半日後。其夫復來曰。服二次後。覺響一聲。視之已收。陰戶訖。

破不可復生。予思之。此非腸胃乃脂膏也。肌肉破尚可復完。若氣

何以服失笑散

但因經宿乾着席上破一片如掌心大在席某妻在家哭泣恐傷破不可復生予思之此非腸胃乃脂膏也肌肉破尚可復完若氣血充盛必可生滿遂用四物湯加入參與一百帖三年後復有子治子宮下用黃耆一錢半人參一錢當歸七分升麻三分甘草二分作一帖水一鍾煎至五分去滓食前服却用五倍子末泡湯洗又用未傳之如此數次宜多服藥永不下
一婦產後水道中出肉線一條長三四尺動之則痛欲絕先服失笑散數次以帶皮姜二觔研爛入清油二觔煎油乾爲度用絹兜起肉線屈曲於水道邊以前薑藥之冷則熨之六日夜縮其大半二六日即盡入再服失笑散芎歸湯調理之如肉線斷則不可治矣

補而升之

五倍固脫也

氣血並補而升

補血固脫

妙在一加一
去有本來升
法

當歸黃耆散

治產後陰脫謂陰戶脫下也

當歸

白芍

黃耆

人參

各二錢

升麻

分五

一方有甘草無芍藥

右剉作一劑水煎食前溫服外用五倍子泡湯洗又用耒傳之

加味八珍湯治產後生腸不收

八珍湯

錢八

黃耆

錢一

防風

升麻

各五分

右剉一服水煎服外以荆芥藿香檳皮煎湯薰洗

加味四物湯治因產用力過多陰門突出

四物湯

錢四

龍骨

另研少許
臨服入

右剉水煎服○陰痛者加藁本防風去龍骨

當歸散治陰脫又名癰疽

若為未每服一錢溫酒米湯任意調下忌食高熱重

告

顏子宮之

原身生蠟
其坊涼而固
脫也

陰脫有腐肝
熱者

純黃其賊溫
而因脫也

溫法

當歸 黃芩 各二兩 白芍 一兩 蠟皮 燒存性 半兩 牡蠣 煨 二兩半

若為末。每服二錢。溫酒米湯任意調下。忌登高舉重。

硫黃散。治產後努力太過。致陰下脫。若脫肛。狀及陰下挺出。逼

迫腫痛。舉動房勞。皆能發作。清水續續小便淋瀝。

硫黃 烏賊魚骨 各半兩 五味子 二錢半

若為末。摻患處。日三易。

烏椒湯。治陰下挺出。

蜀椒 一方不 烏頭 白朮 各半兩

右為末。以方寸匕。綿裹納陰中。入三寸。腹中熱。易之。二日一度。

明且乃復着。七日愈。

寸金散。治婦人子腸下不收。

溫清情涼妙

河陽別上

卷一

三

蛇牀子

韶腦

葫蘆巴

紫稍花各等分

右為末。每服五七錢。煎水半碗。淋洗之。三二遍為効。

復元湯。治產後子宮不收。

荆芥穗

藿香葉

臭椿皮各等分

右咬咀。煎湯薰沉子宮。即入。

一方。有臨產子腸先出。產後腸不收。名曰盤腸。獻花產。

治法。命產母仰臥。却用好米醋半盞。和新汲水七合。攪勻。忽喫。產母面或背。每一喫。令一縮。三喫。三縮。腸則盡收。此良法也。

一方。產腸出。俗用冷水喫母面。其腸自收。此法虛弱之人。切不可用。恐驚怯成病。或即脫絕。以此方治之。

如收子。即以水洗去。頂上華脈。

取意

有法

取嚏之義

用草麻子四十粒。一方法去去殼研爛塗產母頭頂自能收上如收了即以水洗去頂上草麻。

又方。治腸出久而不收爲風吹乾不能收者。

以磨刀水少許火上溫過以潤盤腸仍煎好磁石湯一杯與產母飲之自收。

丹溪方。產後腸不收。

用香煎五觔煎熱盛盆俟溫坐油盆中約一頓食時以皂角末吹入鼻中嚏作立上妙。

雜方。治盤腸產。

半夏爲末。摘鼻中腸自上。

一方全蝎不拘多少爲末。口噙水鼻內搐之立効。

一方以大紙燃薰香。吹滅以蕙薤母鼻中。腸即上。

雜方 治產後陰腫下脫。

鐵精羊脂二味。熨令稠布裏炙熱。熨推內之。

一方用枳殼二兩去穢。剉碎煎湯浸良久。即入。

一方用人尿。燒酒調下方寸匕。

一方腸出盛以潔淨漆器。覆煎黃蓍湯浸之。腸即上。

一方蛇退蛇牀子二味炒熱。布裏熨患處。亦治產後陰痛。

一方單用蛇牀子一升炒熱。布裏熨患處。亦治產後陰痛。

一方燒瓦頭末傅之。

一方以溫水洗軟。却用雄鼠糞燒烟熏入。

灸法 治產後陰脫。灸臍下橫紋二七壯。

一法去... 中產後陰胎... 下橫紋二七壯

一法婦人陰挺出四肢淫灑身悶少海主之照海

一法婦人胞胎門落癰不收常濕炙神關玉泉身交

五十壯三

又法玉泉傍開三寸灸隨年

女人陰門冷腫炙飯來三十壯

○產門不開腫痛

薛氏曰玉門不開氣血虛弱也用十全大補湯腫脹熈痛肝經虛熱也加味道遙散若因憂怒肝脾氣血傷也加味歸脾湯若因暴怒肝火血傷也龍膽瀉肝湯

一產婦玉門不開發熱惡寒用十全大補加五味子數劑而寒熱退用補中益氣加五味子數劑而玉門閉

齊合補丸

保千回大便出血

三

有二火則不
腫若非脾胃
弱則不嘔吐
故用大黃等
藥失其治也

此從飲食
思治法

此從腸下脹
痛治法

一婦人脾胃素弱兼有肝火產後玉門腫痛寒熱作渴嘔吐不食
外敷大黃等藥內用驅利之劑腫及於臂諸證蜂起此真氣虛而
邪氣盛也先用六君子以固腸胃次用補中益氣以升陽氣不數
劑而全愈

一產婦患此失治腫潰不已形體消瘦飲食少思朝寒暮熱自汗
盜汗半年矣用補中益氣湯加茯苓半夏膿水漸少飲食漸進又
用歸脾湯共五十餘劑而愈

一產婦玉門不開小便淋瀝臍內一塊攻走脇下或脹或痛用加
味逍遙散加重前子而愈

一婦人子宮腫大二日方入損落一片殊類猪肝面黃體倦飲食
無味內熱晡熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸證悉愈仍

十全大補湯

治產後血氣大虛陰門不開發熱惡寒

有一婦用此法熏之即死不可不慎大祇宜溫不宜乘熱也蒸以新石灰而加滾湯以熏新產之婦能不傷乎故盡信晉不如無書又當以已意逆之也

品味俱効

衛生香

十全大補湯。治產後血氣大虛。陰門不開。發熱惡寒。

本方加五味子。水煎服。

硫黃湯。治產後玉門開而不閉。

硫黃

兩

吳茱萸

兔絲子

各一兩半

蛇牀子

右剉每服四錢。水一碗。煎湯頻洗之。自効。

欬陰法。治新產後陰腫下脫。及產門不合。

新石灰半升。先放在脚盆內。後以沸湯衝入。乘熱於上熏之。

俟溫用手掬清者。沃淋之。未効日再用。

當歸湯。治產後臍中風冷腫痛。

當歸

獨活

白芷

地榆

各三兩

敗醬。千金翼。各不用三兩。

齊全

六二日不開腫痛

三

禁石各兩

適治暖二字

妙

謂子宮墜下以致大痛也

此子宮當以

玉門為解觀

生腸不收可

想矣不然腹

中之物豈能

脫於玉門

前發可據

此謂陰腫有

瘀血

右剉碎以水一斗半煮取五升適冷暖洗陰日三

一方治婦人子宮大痛不可忍並產後生腸不收

五倍子

白礬各等分

右為末溫酒泡洗疏糝亦可

桃仁膏治產後陰腫妨悶

桃仁去皮

五倍子

枯礬各等分

右為末研桃仁膏拌勻傅

一方單用桃仁去皮尖研細四五次抹之

萬應丸治產後小戶痛不可忍

知母去皮炒為末煉蜜丸如彈子大每服一九清酒送

兩傍屬厥陰
葱延止痛以
其通也四季
愈通而愈通
況同乳香乎
此入理之方
請試思之

化下

一。治產後陰戶兩傍腫痛。手足不能舒伸者。用四季葱入乳香同搗成餅。安於陰戶兩傍。良久即愈。

○乳病

○乳汁不行

大全云。婦人乳汁乃氣血所化。其或不行者。皆由氣血虛弱。經絡不調所致。凡乳汁勿令投於地。更蟻食之。令乳無汁。若乳盈溢。可潑東壁土佳。或產後乳漲或滑作者。此年少之人初經產乳。內有風熱也。須服清利之藥。則乳行。若累經產而無乳者。亡津液故也。須服滋陰之藥以助之。若雖有乳却又不甚多者。須服通經之藥以動之。仍以美臠引之。蓋婦人之乳資以衝脈。衝與胃經通故也。

鍾乳原從氣
化而成故取
之以天八合
氣也微微往
乎

以下五方皆
治盛實發滯

有屢經產而乳汁常多者亦婦人血氣不衰使然若婦人素有疾
在衝任乳汁少而色帶黃者生子則怯弱而多疾

三因方云產婦有二種乳脉不行有血氣盛而壅閉不行者有血
少氣弱澁而不行者虛當補之盛當疎之盛者當用通草漏蘆土
瓜根輩虛者當用煉成鍾乳粉猪蹄鯽魚之屬藥可見矣

薛氏曰前證若氣血虛弱而不能生化者宜壯脾胃怒動肝膽而
乳腫汁出者宜清肝火夫乳汁乃氣血所化在上爲乳在下爲經
若屢產無乳或大便澁滯當滋化源

一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴余謂血氣虛以
玉露散補之而愈

通草散治產後血氣盛實乳汁不通

本草
通草
治產後血氣盛實乳汁不通

各有經濟法
度宜熟味之

此厥陰陽明
藥加牡蠣尤
奇

此散結通塞
劑也

桔梗

錢二

瞿麥

柴胡

天花粉

錢各

通草

七分

青皮

白芷

赤芍藥

連翹

水通

甘草

各五分

右剉一劑水煎細飲更摩乳房

漏蘆散

治婦人肥盛氣脉壅滯乳汁不通或經絡凝滯乳內脹

痛或作癰腫將欲成者此藥服之自然內消乳汁通行

漏蘆

半兩

蛇退

瓜蒌

上校急火煨存性一方用根十枚切片炒焦

右為末每服二錢酒調下仍食猪蹄羹助之○經驗方有牡蠣

燒存性○一方只用牡蠣煨末酒調下

秘傳湧泉散治乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯妳乳脹

痛或作癰腫

王不留行 白丁香 漏蘆 天花粉 僵蠶

立齋方無穿

山甲而以猪

蹄汁一碗酒

一杯煎服其

用龍骨與氣

帶何居意以

通中用藥也

取義而已

湧泉三方俱

有奇藥而此

以穿山龍至

皂角通差所

挑芒蘇生乳

若肉豆蔻者

其善溫胃化

食者然可與

智者生所

右為乳無汁

須以補氣

湧泉散

穿山甲

火炮黃色各等分一方無此味

右為末每服四錢用猪鬃蹄煮汁調下

羅氏湧泉散 治氣滯少乳

瞿麥穗

麥門冬去心

王不留行

龍骨

穿山甲

炮黃各等分

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪鬃蹄羹後服此藥服後以木梳刮左右乳房三十餘下日三服忌食薑椒辛辣之物

湧泉散

穿山甲

白僵蠶

豆蔻

麵包煨熟各四錢

皂角

錢五

胡桃仁

去皮四兩

芝麻

炒半

右為細末每服不拘多少溫酒調下任意飲之

三寶方

治產後乳無

為主此以
土瓜根桂心
通血脉有冷
熱不同全無
氣血之劑而
甘草一味又
過於法外矣

土瓜根

漏蘆

各三兩

通草

四兩

甘草

二兩

右剉碎以水八升煎取二升分溫三服○一方加桂心並為末酒服方寸匕

胡桃散治婦人少乳及乳汁不行

核桃仁

去皮十箇搗爛

穿山甲

為末一錢

右搗和一處黃酒調服

皂角散治乳汁不通及乳結硬疼痛

皂角

燒粉

蛤粉

右為末每服二錢熱酒調服○歌曰婦人吹乳意如何皂角燒灰蛤粉和熱酒一杯調八字須臾核散笑呵呵

張氏方滋益氣脉榮衛行津液

葵子

炒香

縮砂

仁各等分

右為細末。每服二錢。熱酒調下。

雜方 下乳汁。

姑蘆子洗淨。炒令香熟。瓦土搗令白色為末。酒調下一錢。合

面臥少時再服。

一方瓜蔓一枚。熟搗以白酒一斗。煮取四升。去滓溫飲。一升日三

一方土瓜根為末。酒調下一錢。日三服。

一方京三稜三箇。水二碗。煮取一碗。洗之。取汁下為度。妙。

一方穿山甲洗淨一兩。灰炒燥為細末。酒調服方寸匕。治產乳無

汁。亦治乳結癰腫。

○已上治乳滯不行之劑。

以洗法通氣
又是一法

日下醫書

加味四物湯

治氣血虛乳汁不通

當歸

川芎

白芍藥酒

生地黃

木通

王不留行

天花粉各三分

右剉一劑同獐猪蹄傍肉四兩煎湯二鍾入藥同服先將葱湯

類洗乳房

玉露散治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便澀滯

此藥涼膈壓熱下乳

人參

白茯苓

當歸各五分

芍藥七分

川芎

桔梗炒

白芷各一錢

甘草五分

右咬咀水煎食後服如熱甚大便秘加大黃炒三分

當歸補血加葱白湯

治產後無乳

然會其理則各臻至妙通試法尤為入門便訣按第一方以四物不用熟地第二方合四君而無白水更去生地第三方有黃芪或歸或苁或甘草以至梗糯米羊蹄鍾乳種種變更皆不出於至中至正之道噫其能復超於法外否

此方亦從袖
法來而以參
白引入乳房
尤為捷徑

當歸二錢

黃耆兩

葱白根

右剉水煎服

通脉散 治女人乳少

當歸

天花粉

木通

牡蠣

穿山甲

右為細末用猪蹄湯入酒少許調服

通乳湯

治乳後氣血不足經血衰弱乳汁澀少

猪蹄四隻

通草二兩

川芎兩

穿山甲

十四片炒黃

甘草一錢

右用水五升煮汁飲之忌生冷避風寒夜卧不宜失蓋更以葱

湯頻洗乳房

一方治乳汁不通

當歸

穿山甲

酥炙各五錢

天花粉

王不留行

右為細末每服三錢猪蹄湯或熱酒調下其乳即通

甘草 各三錢

右為細末。每服三錢。猪蹄湯。或熱酒調下。其乳即通。

猪蹄湯。治妳婦氣少力衰。脉澁不行。絕乳汁。

猪蹄 一隻 通草 兩

右將猪蹄淨洗。依食治法。次用水一斗。同通草浸煮。得四五升。

取汁飲之。未作二料。

立効散。下乳法。

粳米 糯米 各半 蒿苳子 一合並 生甘草 兩

右研細。用水二升。煎取一升。去淨。分三服。立下。

又方。治乳汁少。

瓜蒌根 薄荷幹身 各等分

陰以穀氣為上。即糯米。又為養陰。助乳之大藥也。

羊肉補形
荷葱絲和味
引經通滯

右為麤末。先喫羊蹄汁一碗。次服藥。後再喫葱絲羊羹湯。少許立効。

鍾乳散。治乳婦氣少血衰。脉澁不行。乳汁絕少。成鍊鍾乳粉。研細濃煎。漏蘆湯調下二錢。

雜方。有人乳汁不行。已十七日。諸藥無効。遇有人送赤豆一斗。遂時常煮粥食之。當夜乳脉通行。

一方。麥門冬不拘多少。去心。焙為末。以酒磨犀角約一錢許。煖調二錢服之。不過兩服。乳汁便下。

○已上治乳少不行之劑。

○乳汁自出。

當觀人勇法。吸乳引濃。後天全云。產後乳汁自出者。乃是胃氣虛所致。宜服補藥以止之。若

此清心法可
為健勞者一
助云乃又超
于法外矣

有清心法

且以是篇風濕散亦

當親人更法
以補虛
有湧溢故也

乳多溢滿急痛者。溫帛熨之。產寶有是論。却無方以治之。若有此證。但以漏蘆散亦可。

予曾診一內
氣盛。厥旺。患
乳泣。其生子
長而遊庠。其
不育之說。亦
未必盡然也。

有未產前乳汁自出者。謂之乳泣。生子多不育。經書未嘗論及。薛氏曰。前證氣血俱虛。用十全大補湯。肝經血熱。用加味逍遙散。

肝經怒火。用四物柴梔芩連。肝脾鬱結。用加味歸脾湯。

一產婦勞役。忽乳汁如湧。昏昧吐痰。此陽氣虛而厥也。灌以獨參

湯而甦。更以十全大補湯數劑而安。若婦人氣血方盛。乳房作脹。

或無兒飲脹痛。增寒發熱。用麥芽二三兩炒熟。水煎服。立消其耗

散血氣如此。何脾胃虛弱。飲食不消。方中多用之。

漏蘆散。方見前。

免懷湯。欲摘乳者。用此方通其月經。則乳汁不行。

當歸尾

芍藥

紅花酒

牛膝酒
五錢

右劉水煎服。

一方。治婦人血氣方盛。乳房作脹。或無兒食乳。要消者。服此立消。

麥芽二兩。炒熟水煎服。○一方炒為末。煎四物湯調服。即止。

吹乳癰腫。

大全云。產後吹妳者。因兒喫妳之次。忽自睡着。為兒口氣所吹。令乳汁不通。蓄積在內。遂成腫硬。壅閉乳道。傷結疼痛。亦有不疼。不痛。腫硬如石者。總名曰吹妳。若不急治。腫甚成癰。遂有至死者。連服皂角散。括蘆散。傳以天南星散。更以手揉之。則散。

薛氏曰。前證用藥。切不可損其氣血。

薛氏曰：前證用藥，切不可損其氣血。

立方有法用
藥有訣不可
不達

丹溪云：乳房陽明所經，乳頭厥陰所屬。乳子之母，不知調養，或為忿怒，所逆鬱悶，所過厚味所醢，以致厥陰之氣不行，故竅不通而汁不得出。陽明之熱沸騰，故熱甚而化濕。亦有所乳之子，膈有滯痰，口氣熾熱，合乳而腫，熱氣所吹，遂生結核。於初起時，便須忍痛揉令稍軟，吮令汁透，自可消散矣。此不治必成癰癤。治法：疎厥陰之滯，以青皮、橘陽明之熱，以細研石膏行汚濁之血，以生甘草節消腫導滯。以瓜蒌子或加沒藥、青橘葉、皂角刺、金銀花、當歸頭，或湯或散，加減隨意。消息然須少酒佐之，若加以芟火，兩三壯於腫處，其効尤捷。彼村工毒於自徭，便妄用鍼刀，引惹拙病，良可哀憫。李氏曰：婦人之乳，男子之腎，皆性命根也。

初起煩渴嘔吐者，胎前風熱也。甚則毒氣上衝，咽膈妨礙，寒熱者。

肝邪也。此皆表證。宜不換金正氣散。加天花粉。能止渴。嘔定寒熱。咽隔有碍者。甘桔湯加生薑。或護心散。如潰後見此。四證爲虛。飲食厚味。忿怒憂鬱。以致胃火上蒸。乳房乳汁化爲濁膿。肝經氣滯。乳頭竅塞不通。致令結核不散。痛不可忍。初起便宜隔蒜灸。法切忌鐵刀能飲者。一醉膏加芎歸各一分。一服兩服卽効。不能飲者。瓜蒌散。

結核亦有因氣血虛弱。被外感內傷。以致痰瘀凝滯而成核者。俱以芷貝散爲主。血虛合四物湯。更加參朮柴胡升麻。氣虛合四君子湯。更加芎歸柴胡升麻。憂思傷脾者。歸脾湯加瓜蒌根貝母白芷連翹甘草節水酒各半煎服。有肝火結核腫痛甚者。清肝解鬱湯。

不散作痛。初起須忍痛揉合痛止。吸合汁透。自可消散。不效宜

自肝火結核腫痛甚者清肝解毒湯

吹乳因乳子膈上有痰口氣熾熱含乳而睡熱氣吹入乳房凝滯不散作痛初起須忍痛揉令稍軟吸令汁透自可消散不散宜益元散冷薑湯或井水調一日一夜服三五十次自解重者解毒湯頓服之挾氣者正貝散單青皮湯外用漏蘆爲末水調敷之又有乳汁不行外乳脹痛者湧泉散

核久內脹作痛外腫堅硬手足不近謂之乳癰未潰者仍服瓜蒌散內托升麻湯或復元通氣散加漏蘆虛者托裏消毒散將潰兩乳間出黑頭瘡頂下作黑眼者內托升麻湯已潰寒熱者內托十宣散少食口乾者補中益氣湯肺熱內熱者八物湯加五味子胃虛嘔者六君子湯加香附砂仁胃寒嘔吐或瀉者六君子湯加乾薑藿香遇勞腫痛者八物湯倍參耆歸木遇怒腫痛者八物湯加

山梔。

王損菴曰。隆慶庚午。予自秋閒歸則亡。妹已病。蓋自七月乳腫痛。不散。八月用火鍼取膿。醫以十全大補湯。與之外敷。鐵符散不効。反加喘悶。九月產一女。潰勢益大。而乳房爛盡。迺及胸腋膿水稠粘。出膿幾六七升。略無効勢。十一月始歸就醫。改用解毒和平中劑。外搽生肌散。龍骨寒水石等劑。膿出不止。流踐所及。卽腫泡潰膿。兩傍紫黑。瘡曰十數。胸前腋下皆腫潰。不可動側。其勢可畏。余謂產後毒氣乘虛而熾。宜多服黃耆解毒補血。益氣生肌。而醫不敢用。十二月中旬。後益甚。瘡口念餘。諸藥及試不効。始改用予藥。時膿穢粘滯。煎楮葉猪蹄湯沃之。頓爽。乃治一方。名黃耆托裏湯。黃耆之甘溫。以排膿益氣。生肌爲君。甘草補胃氣解毒。竈蹄身和。

黃耆之甘溫以排膿益氣生肌爲君。甘草補胃氣解毒。黃芩歸身。

血生血爲臣。升麻葛根漏蘆爲足陽明本經藥。及連翹防風皆散結疎經。瓜蒌仁鼠粘子解毒去腫。皂角刺引至潰處。白芷入陽明排膿長肌。又用川芎三分及肉桂。此藥爲引。川芎劑入酒一盞煎送。白玉霜丸疎膿解毒。時膿水稠粘方盛。未已不可還用。收澁之藥理宜追之。以翠青錠子外搽。明日膿水頓稀。痛定穢解。始有向安之勢。至辛未新正。患處皆生新肉。有紫腫處俱用葱熨法。隨手消散。但近腋足少陽分尚未軟。乃加柴胡一錢。青皮三分。及倍川芎。膿水將淨者。卽用搜膿散搽之。元宵後遂全安。

康祖爲廣德宰。事張王甚謹。後授溫倅。左乳生癰。繼又胸臆間結核。大如拳。堅如石。荏苒半載。百療莫効。已而牽掣臂腋。徹於肩。痛楚特甚。急禱王祠。下夢聞語曰。若要安。但用生姜自然汁製香附。

服之。覺呼其子檢。本草視之二物。治證相符。訪醫者亦云。有理遂用香附子去毛。薑汁浸一宿為末。二錢米飲調。方數服。瘡膿流出。腫硬漸消。自是獲愈。

一婦人喜貴性躁。懷抱久鬱。左乳內結一核。按之微痛。以連翹飲子二十餘劑。少退。更以八珍加青皮香附。桔梗貝母。二十餘劑而消。

消毒飲。治吹乳吹癰。并便毒。如增寒壯熱。或頭痛者。先服人參。

敗毒散一二劑。方可服此藥。如無前證。即服此二三劑。或腫不消。宜服托裏藥。

消。宜服托裏藥。

當歸 白芷 青皮去白 貝母 柴胡

天花粉 僵蠶炒 金銀花各三錢

白芷為陽明經排膿止痛。青皮柴胡行厥陰經氣滯。當歸行血。大花粉通血脈。蠶散結痰。貝母開肺痰。金銀花味甘。

天花粉 一厘 雄蟲 沙 金銀花 久 三

總用其
加大黃以治

便毒者亦行
厥陰汚濁之

血也
此專行厥陰

氣血凝滯之
藥

藥

劉一劑水煎服○便毒加大黃煨一錢空心服

連翹飲子 治乳癰

連翹結熱

瓜蔓仁 緩痰

緩用

川芎 血

皂莢刺

橘葉氣

青皮氣

甘草節 血

桃仁 各二錢 血

右作一服水煎食遠服○如已破者加麥蘆當歸未破者加柴

胡升麻

一方 治血脉凝注不散結成吹乳乳癰痛腫不可忍者

天花粉

金銀花

皂角刺

穿山甲

當歸尾

白芷稍

瓜蔓仁

貝母 去心

甘草節

右劉酒煎服

以乳房結核

又方

治婦人乳中結核

天花粉

吹乳癰腫

長

故用升麻、青皮、連翹散、結熱甘飴、瓜、蔓、緩肝潤燥也。

治黑陷妙劑而黃蘗之用所以治陷也。肉桂之用所以發毒也。

風熱即肝熱生風言熱則火在其中矣。治以道遠散加山枝四物養肝血清肝熱也。治風血即

升麻

連翹

青皮

甘草各二錢

瓜蒌仁三錢

右作一服。水煎食後細細呷之。

內托升麻湯。

治婦人兩乳間出黑頭瘡頂陷下作黑眼並乳癰。

初起亦治。

升麻

當歸身

葛根

連翹

黃蘗

各二錢

黃耆三錢

牛旁子

甘草

各一錢肉桂五分

右作一服。水一鍾酒半鍾煎食後服。

清肝解鬱湯。

治肝經血虛風熱或肝經鬱火傷血乳內結核或

為腫潰不愈。凡肝膽經血氣不和之證宜用此藥。

人參去蘆

茯苓

熟地黄

芍藥炒

貝母去心

山梔炒

白木

當歸

各一錢五分

柴胡

右水煎服。

山鹿 步 踏 白木 當歸 各 一 錢 柴 胡

牡丹皮 川芎 陳皮 各 八 分 甘草 五 分

同白米非氣 虛者不宜輕 用

此方重在破 字上

右水煎服

一方 乳藥破則少有生者必大補或庶幾耳

人參 黃耆 白朮 當歸 川芎

連翹 白芍 甘草脩

右剉水煎服 一方有青皮瓜蒌無白朮 乳岩小破加柴胡

一方 治乳硬痛

當歸 甘草 各 三 錢 沒藥 二 錢

右作一服水煎入酒少許熱飲

金銀花散 治乳脉不行結成癰腫疼痛不可忍者

金銀花 當歸 黃耆 各 二 錢 甘草 錢 半

以乳脉不行 而用黃耆宜 詳之

破二字亦一 竅須得之小 木此方中之 皮瓜蒌無白 以乳藥有青

黃藥子解熱毒要藥而所配諸藥又極當是丹溪論中語也

石膏青皮是一陰行而配法差別

在核上上看

右作一服水煎入酒半鍾食後溫服。

丹溪方。治乳腫痛。

青皮 石膏煨 連翹 皂角刺炒 黃藥子

當歸頭 木通各一錢 生甘草三分

右作一帖水煎入好酒些少同煎服。

一方。治乳癰妳勞癰腫。

石膏煨 樺葉燒 瓜蒌子 青皮 甘草節

右剉水煎服。

一方。治乳有核。

南星 貝母 甘草節 瓜蒌各一兩 連翹半兩

右以水煎入酒服。

通氣二五子丸 木香 茴香 青皮 穿山甲 酥 陳皮

右以水煎入酒服。

通氣三字妙。

復元通氣散。治婦人乳癰及一切腫毒。

木香 茴香 青皮 穿山甲 酥 陳皮

白芷 甘草 漏蘆 貝母去心姜製 各等分

右為細末。每服三錢。好酒調下。

治乳癰方。

行結氣結血。其加參基文。是一法。

青皮 瓜蒌子 橘葉 連翹 桃仁尖留

皂角刺 甘草節

右水煎服。如破多加參茸。

神効瓜蒌散。治婦人乳癰。乳岩神効。

此用乳沒法始。

黃瓜蒌子多者不去 當歸酒洗 生甘草各五錢 乳香

沒藥各另研一錢半

右作一劑用。好酒三碗。於磁石器中。慢火熬至碗半。分爲三次。食後服。如有乳岩。便服此藥。可杜絕病根。如毒氣已成。能化膿。爲黃水。毒未成。則內消。疾甚者。再合一服。以愈爲度。立効散。與此間服神効。但於瓜蒌散方。減去當歸。加紫色皂角刺一兩。六錢是也。

冤源五物湯。

治癰疽發背。乳癰通用。

括蘂

炒一校

皂角刺

半燒帶生

沒藥

各半兩

乳香

甘草

各半兩

右劉用醇酒三升。煎取二升。時時飲之。痛不可忍。立止。

括蘂散。

治吹乳。

乳香

一錢研

括蘂

一個一方用根一兩

右劉用酒煎服。或爲末。溫酒服二錢。外用南星末。溫湯調塗。

痰神驗。因小兒吹乳。變成癰疾者。並皆治之。

右劉用酒煎服或為末溫酒服二錢外用青是末日服易調金

橘青散 治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍者樂了即不

疼神驗因小兒吹乳變成斯疾者並皆治之

陳皮去白乾麩炒 麝香一分

右研勻酒調下二錢被益汗出即愈

補遺方 治吹乳結實腫痛

陳皮亦厥陰藥

陳皮二兩 甘草一錢

右剉水煎分兩次服用荆芥羌活獨活煎湯熏洗即散

一方 治乳癰

夜明砂 瓜蒌炒 阿魏

右為末飯丸酒吞下

通和湯 治婦人乳癰疼痛不可忍者

此方無分兩大都以夜明破為藉以破結血也瓜蒌為以潤結痰也阿魏為佐軟堅破帶

也。
自然銅其通
並滑者歟。

穿山甲

炮黃

木通

各兩

自然銅

半兩醋
滓七次

右為末

每服二錢

熱酒調下食遠服。

二灰散

治產後乳汁不泄結滯不消熱毒。

蔓荊子

燒

皂角刺

燒各
等分

右為末

每服二錢

溫酒調下無時。

夜陰散

治吹乳乳癰。

蜘蛛

三箇

紅棗

三枚
去核

右每棗一枚

入蜘蛛一箇

夾於內炒熟口嚼喫用燒酒送下未

成者立消已成者立潰。

獨勝散

治婦人吹奶初覺身熱頭疼寒熱及胸乳腫硬是其候

也服之能令下乳汁通血脈立能自消。

右為末每服二錢酒調服腫硬立消其者不過三服。

也服之能令下乳汁通血脈止能自消

白丁香 真者

右為末每服二錢酒調服腫硬立消甚者不過三服

一方治婦人吹乳硬腫身發熱增寒疼痛難忍不進飲食者服

之良驗

此藥行厥陰經

鹿角一兩炭火煨存性研細分作三服先將末藥五錢入鍋次下無灰酒一碗滾數沸倒在碗內乘熱盡飲卧服汗出即

安

一方用鹿角剉為細末酒調二三錢服亦効

一方用鹿角於麤石上磨取白汁塗之乾又塗

勝金丹 治吹乳結核不散腫痛者神効亦治乳岩

百齒霜 即梳齒上頭垢

右用無根水。丸如雞頭子大。以黃丹爲衣。每服一九。或二九。好酒下。如不飲酒。白湯下。不可化開。亦不可令病人知。極有效驗。

一方。治乳癰。及無名腫毒。初起。

用五葉藤。一名五龍爪。不拘多少。生薑一塊。好酒一碗。搗爛。去渣熱服。汗出爲度。仍以渣敷。

破血破氣破
敷乳方

痰

天南星 皂角刺燒帶生 半夏生各三分 白芷 草烏

直疆蠶一分

葱與蜜反故
用之

右爲細末。多用葱白研取汁。入蜜調敷。若破瘡口。用膏藥貼。葱熨法。治吹乳乳癰。登時立消。

用連根葱一大把。搗爛成餅。一指厚。攤乳上。用銅罐盛灰火。

通陽明。通結。

通明雅集

用連根葱一大把搗爛成餅一指厚攤乳上用銅確盛滅火

覆葱上須更汗出即愈

一方治吹妳

金銀花 天蒜麥 紫葛藤 各等分

右以醋煎洗患處立消如無蕎麥葛藤二味只金銀花亦可

一方治乳癰

大黃 鼠糞 新者各一分 黃連二分

右三味搗爲末以黍米粥清和傅乳四邊痛止即愈無黍米粟

米粳米亦得

柳根熨法治乳癰二三百日瘰癧不瘥但堅紫色青

用柳根削取上皮搗令熟熨令溫盛者練囊中熨乳上乾則

易之一宿即愈

雜方 治吹乳乳癰

用新栢葉一握洗淨以朴硝一分同入臼內杵之旋加清水
紐取自然汁半碗先以病人飲三兩口仍用鷄翎蘸汁掃於
患處中間留一眼四邊頻頻掃之其腫自消

一方用生地黃搗汁塗之一日三五次立效

一方用生山藥搗爛敷上即消消即去之遲則肉腐

一方採嫩桑葉研細米飲調攤紙花貼患處

一方用蒲公英搗爛會患處神妙

一方用天南星爲末以溫酒調塗

一方以益母草爲末調塗或生搗爛用之

一方治吹乳用桑樹蛙屑飯搗成膏貼之

一方用野椒桑和藥一同搗膏敷患處

上方治乳用桑樹生屑。取酒和成膏貼之。

一方用遠志酒煎服。傳患處。

一方用野椒桑和藥。一同搗膏敷患處。

一方用嵐粘子。加射干酒吞下。

一方治乳癰。用人牙齒燒存性。研為細末。以酥調塗貼癰上。

一方治吹乳初覺。用白紙一小塊。寫山田火三字。如左乳患。踞於右鞋底。右乳患。踞於左鞋底。神効。是金石揉熨。

一方治乳癰初發。用貝母為末。每服二錢。溫酒調下。卽以兩手覆按於桌上。垂乳良久自通。

一方用真樺皮為末。酒服。方寸七。睡醒已失。

一方用蒲公英忍冬藤酒煎服。卽欲睡。是其効也。

一方單用蒲公英煮汁。飲及封之立消。

一方治吹乳用猪牙皂角去皮。弦蜜炙爲末。酒調服之。

一方用大車頭邊油垢。丸如桐子大。每服五十丸。溫酒下。

一方。嘔噤去足。用葢燒存性爲末。每服二錢。黃酒下。

一方用黍子一合。黃酒下卽散。

一方治吹乳未成膿者。用鼠糞二十一粒。研爲細末。冷水調服。立效。

○妬乳

夫妬乳者。由新產後兒不能飲。致乳不洩。或乳脹捏其汁不盡。皆令乳汁黃結。與血氣相搏。卽壯熱大渴。引飲牢強掣痛。手不得近是也。初覺便知。以手捏去汁。更令傍人吮吮。引之不爾。或作瘡有膿。其熱勢盛。必成癰也。輕則爲吹乳妬乳。重則爲癰。雖有專門。不可不知。

如乳。百療不差。動經年月。名爲妬乳。宜以赤龍皮湯。天麻湯洗之。傳二。

可不細

浸淫瘡亦名如乳

缺漏苦散

有餘者瀉之也

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡墮之黃汁出浸淫漸長

百療不差動經年月名為妬乳宜以赤龍皮湯天麻湯洗之傳二

物湯飛鳥膏及飛鳥散始作者可傳以黃芩漏蘆散黃連胡黃連胡散並進

連翹散治產後妬乳并癰疽下之

連翹 升麻 玄參 芍藥 白欬 防風 射干

杏仁 芒硝 大黃 甘草各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

瓜蒌散治乳初結脹不消令敗乳自返

瓜蒌一個半 粉草一寸半 生薑一塊半

右剉用酒二碗煎服少頃痛不可忍即搜去敗乳臨臥再一服

順所患處乳側臥於床上令其藥行故也無生薑用麥芽

一方 治乳妬

黃芩 白鯁 芍藥

將法有見解

右爲末。以漿水飲服半錢。七日三。若左乳汁結者。卽得去左乳。若右乳汁結者。可將去右乳。

赤龍皮湯 治妬乳

櫛皮三升。水一斗。煮五升。夏冷洗。秋冬溫之。分以洗乳。

天麻湯 治妬乳。亦洗浸淫。黃爛熱瘡。痒疽濕陰。蝕瘡。小兒頭瘡。

天麻草五升。以水一斗半。煎取一斗。隨寒溫分洗乳。以殺痒。

也。洗畢。傳膏散。

飛鳥散 治乳頭生瘡。及諸熱浸淫。丈夫陰蝕。痒濕。小兒頭瘡。疔。

蝕等瘡。並以此傳之。

卽益母

右二味。搗爲細末。以油煎和之。令如脂。以搗乳瘡口。三有汁可。

等膏並以此傳之

維粉燒硃砂作水銀上黑 枯礬二兩

右二味。篩為細末。以油煎和之。令如脂。以搗乳瘡口。三有汁可

乾。搽。

黃連用分膏。治乳瘡並諸濕痒。黃爛肥瘡。

黃連二兩 胡粉二兩 水銀一兩 同研

右三味。相和皮裏熟。援之。自和合也。縱不成一家。且得水銀細

散入粉中。以傳乳瘡。

一方。治妬乳生瘡。

蜂房 猪甲中土 車轍中土各等分

右二味。為末。苦酒和傳之。

鹿角散。治婦人乳頭生瘡。汁出疼痛欲死。不可忍著。

治乳

是

鹿角三分

甘草一分

石二味爲末。和以鷄子黃。於銅器中置溫處。炙上。傅之。日再。卽愈。神驗。不傳。

雜方 治妬乳乳癰。

燒白死蛇爲灰。和以猪膏塗之。大良。

一方。葵莖及子搗篩爲末。酒服方寸匕。卽愈。

一方。鷄屎乾爲末。酒服方寸匕。須臾三服愈。

一方。馬溺塗之立愈。

一方。取搗米槌二枚。炙令熱。以絮及故帛搗乳上。以槌更互熨之。瘡止。已用立効。

一方。皂角十條。以酒一升。揉取汁。硝石半兩。煎成膏。傅之。

一方。用赤小豆。酒研爛。溫服。滓封患處。

一方皂角十條以酒一升。採取汁。硝石半兩。煎乾。膏便之。

一方蔓荊子搗爛。酒服。仍以滓敷患處。

一方用赤小豆。酒研爛。溫服。滓封患處。

一方仙人掌草一握。小酒糟一塊。生薑一大塊。同研爛。入桂末少。

託炒。酒服。滓登患處。

一方治乳頭裂破。

用丁香為末。傳之。一方用秋茄子裂開者。陰乾。燒存性。水。

調塗之。

補遺方。治婦人乳頭小。淺瘡爛痒。

用芙蓉花。或葉。乾為末。搽之。

○乳巖

○丹溪云。婦人不得於夫。不得於舅。始憂。愁鬱過時。日積。累脾氣。

消沮肝氣橫逆遂成隱核如贅棋子不痛不痒十數年後方為瘡
陷名曰乳巖以其痛形嵌凹似巖穴也不可治矣若於始生之際
便能消釋病根使心情神安然後施之治法亦有可安之理予族
侄婦年十八歲時曾得此詔審其形脈稍實但性急躁仇儷自備
所難者從姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑
兩月而安

經通肝氣能
散經止則血
枯矣

此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而成又有滯乳
因見口氣吹噓而成又有拘怒氣激滯而生者煖石膏癰腫皮爪
蟻子甘草節青皮皆神效藥也婦人此病若早治之便可立消有
月經時悉是輕病五六十後無月經時不可作輕易看也
一婦年六十厚味鬱氣而形實多姪夏無汗而性急忽左乳結一

惜哉

小核大如棋子。不痛。自覺神思不佳。不知食味。纔半月。以人參調青皮甘草。未入生薑汁細細咽。一日夜五六次。至五七日消矣。此乃妬岩之始。不早治。隱至五年十年已後。發不痛不痒。必如乳下潰一竅。如巖穴出膿。又或五七年十年雖飲食如故。洞見五內。乃死。惟不得於夫者有之。婦人以夫爲天。失於所天。乃能生此。此謂之巖者。以其如穴之嵌呀空洞。而外無所見。故名曰巖。患此者必經久淹延。惟此婦治之早。正消患於未形餘者。皆死。凡十餘人。又治一初嫁之婦。只以青皮甘草與之安。

龔氏曰。婦人乳岩。始有核腫。如贅棋子大。不痛不痒。五七年方成瘡。初便宜多服疎氣行血之藥。須情思如意。則可愈。如成瘡之後。則如岩穴之凹。或如人口有唇。赤汁膿水浸淫胸腹。氣攻疼痛。

用五灰膏去蠹肉生新肉漸漸收斂此疾多生於憂鬱積忿中年婦人未破者尚可治成瘡者終不可治宜服十六味流氣飲

薛氏曰乳岩乃七情所傷肝經血氣枯槁之證大抵鬱悶則脾氣阻肝氣逆遂成隱核不痛不痒人多忽之最難治療若一有此宜戒七情遠厚味解鬱結更以養血氣之藥治之庶可保全否則不治惟一婦服益氣養榮湯百餘劑血氣漸復更以木香餅炙之喜其謹疾年餘而消餘不信乃服剋伐行氣之劑如流氣飲敗毒散反大如覆碗自出清膿不飲而歿

李氏曰有鬱怒傷肝脾結核如蟹棋子大不痛不痒五七年後外腫紫黑內漸潰爛名曰乳巖滴盡氣血方愈急用十六味流氣飲及單青皮湯兼服虛者只用清脾解鬱湯或十全大補湯更加

飲及單青皮湯兼服。虛者只用清脾解鬱湯或十全大補湯更加

有如是之神鼻二宿而消

清心靜養。庶可苟延歲月。經年以後。必於乳下潰一穴出膿。及中年無夫婦人。灰尤速。惟初起不分通何經絡。急用葱白寸許。生半夏一枚。搗爛為丸。如芡實大。以綿塞之。如患左塞。右塞。左

久潰爛。

青皮 甘草

右為末。用人參煎湯。人生薑汁調細細呷之。一日夜五六次。至消乃已。○年少婦人。只用白湯調下。

十六味流氣飲 治乳岩

當歸 川芎 白芍藥 黃耆 人參 官桂

乳岩之病。大都生於鬱氣。其用主怒其性條達。鬱而不舒。則曲其挺然之質。乳頭屬厥陰經。其氣與痰時為積果。故成結核。茲以風

東子下。令病人曲身低頭。將口鼻及病乳。常吸烟氣未甚縮。再用一料。則瘀血消。而乳頭自復矣。若更不復舊。用革麻子搗爛。貼頂上。片時收。卽洗去。

濟陰綱目卷之十四

終



